

Sterne caugek

Sterna sandvicensis



Groupe d'Etudes
Ornithologiques
des Côtes d'Armor

G.E.O.C.A

Espèce polytypique, la Sterne caugek a une large distribution mondiale. Les populations européennes, estimées entre 82000 et 130000 couples, se reproduisent du littoral ouest jusqu'à la mer Caspienne et hivernent jusqu'en Afrique du Sud (**B**; **D**). En France, il s'agit d'une nicheuse peu commune (5900 à 7200 couples dans les années 2000), d'une hivernante rare (sans doute plus de 1000) mais d'une migratrice commune le long des côtes (occasionnelle dans les terres) (**D**). La Bretagne concentre une grande part de la population nicheuse nationale avec environ 1800 couples (Loire-Atlantique comprise) dans les années 2000 (**C**). Migratrice commune à très commune, elle se raréfie en hiver mais reste régulière sur le littoral en petits effectifs.


Statut en Côtes-d'Armor

Sur le littoral des Côtes-d'Armor, la Sterne caugek est une nicheuse rare et localisée, une migratrice commune et une hivernante peu commune. La reproduction de l'espèce varie assez fortement dans le temps et l'espace au gré des colonisations et reports des grandes colonies bretonnes. La colonie de l'îlot de la Colombière (Saint-Jacut-de-la-Mer)

est le site le plus fréquenté (jusqu'à 258 couples en 2006, 350 couples en 1990) et le plus régulier (reproduction annuelle). En 2011, lors du dernier recensement national, entre 228 et 248 couples ont niché en Côtes-d'Armor (mais seulement 44 à 57 couples pris en compte du fait du report probable d'oiseaux issus d'autres départements) sur 3 secteurs: la Colombière (184 à 191 couples), l'archipel des Sept-Iles (38 à 51 couples) et les archipels du Trégor-Goëlo (6 couples) (FE). Sur ce dernier secteur qui fait l'objet d'un suivi précis depuis 2000, la Sterne caugek ne s'est reproduit que 8 années sur 14 avec des effectifs variant de 3 couples (en 2002) à 252 couples (en 2006).

En migration, la Sterne caugek est commune et peut s'avérer localement abondante. Dès le mois de juillet, des migrateurs originaires de colonies plus nordiques stationnent sur le littoral. Un jeune bagué le 18 juin 2013 aux Pays-Bas et encore observé le 10 juillet sur son lieu de naissance fut ainsi observé avec des adultes sur un reposoir de l'archipel de Bréhat le 27 juillet 2013, preuve de la dispersion rapide des oiseaux et des potentiels risques de mauvaise interprétation d'indices de nidification (transport de nourriture).

Sterne caugek Nidification (2004-2012)



Auteur : Yann Février

Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances. Saint-Brieuc, 416 p.



Sterne caugek

Sterna sandvicensis



Groupe d'Etudes
Ornithologiques
des Côtes d'Armor

G.E.O.C.A

Les suivis de migration de sternes sont difficiles et seuls les regroupements alimentaires ou les repaires peuvent faire l'objet de comptages : maximum de 820 oiseaux dans l'anse d'Yffiniac le 24 août 1992, 600 devant l'enrochement du Légué (Saint-Brieuc) le 16 août 2001, 520 devant Gwin Zegal (Plouha) le 6 octobre 1985... Les rassemblements de plusieurs centaines d'oiseaux ne sont donc pas rares sur le littoral durant le pic de migration post-nuptiale (août à octobre), notamment en baie de Saint-Brieuc. Le passage pré-nuptial est très peu détecté en revanche. Au vu des effectifs conséquents et du renouvellement, on constate donc que plusieurs milliers de Sternes caugeks transitent par le département, y compris dans les terres (contacts sonores nocturnes au-dessus de quelques villes).


En période hivernale, la Sterne caugek ne fait pas l'objet de suivis ou de décomptes précis mais les comptages de la mi-janvier et quelques opérations concertées permettent de dénombrer régulièrement plusieurs dizaines d'oiseaux sur quelques sites (baie de Lannion, Trégor-Goëlo, baie de Saint-Brieuc, côte de Penthièvre, estuaire de la Rance...) avec par exemple 83 ind. le 3 janvier 2009 à la pointe des Guettes (Hillion), 70 ind. sur le même

site le 24 décembre 2012 ou encore 43 ind. à Carroul (Erquy) le 29 janvier 1999. Ces observations laissent penser à un hivernage assez conséquent dans le département, sans doute bien supérieur à la centaine d'oiseaux.

Tendances et perspectives

En Europe, la Sterne caugek présente un statut jugé défavorable (**B**) et en France, elle est inscrite comme *Vulnérable* sur la Liste Rouge nationale (**U**). Les îles et îlots des Côtes-d'Armor s'intègrent à un réseau de sites favorables et potentiels d'installation très important pour la conservation de l'espèce à l'échelon national. Ils se doivent donc d'être protégés et conservés, ce qui n'est actuellement le cas que d'une minorité d'entre eux (Colombière, Sept-Iles). Les îlots du Trégor-Goëlo notamment, vu leur importance pour la reproduction des oiseaux marins, mériteraient d'être intégrés à un dispositif de protection tel un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope. Le département joue également un rôle important pour le stationnement et l'alimentation de milliers de Sternes caugeks en migration et notamment les zones littorales de la baie de Saint-Brieuc dans son ensemble (côte de Penthièvre et Goëlo compris).

Sterne caugek Répartition hivernale (2009-2013)



Auteur : Yann Février

Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances. Saint-Brieuc, 416 p.