

# Tarier des prés

*Saxicola rubetra*



Groupe d'Etudes  
Ornithologiques  
des Côtes d'Armor

**G.E.O.C.A**

Le Tarier des prés est une espèce monotypique se reproduisant depuis le nord de l'Espagne et des îles Britanniques jusqu'à l'ouest de la Sibérie (**B** ; **D**). Migratrice, ses quartiers d'hiver se situent au sud du Sahara et dans une bande orientale qui atteint le Malawi au sud (**B**). Le statut de l'espèce en Europe, où 5,4 à 10 millions de couples nicheurs sont estimés dans les années 2000, est jugé favorable du fait de la croissance ou de la stabilité de certaines populations clés (Biélorussie, Pologne, Roumanie et Russie) mais c'est une baisse des effectifs qui est constatée dans la majeure partie des pays (Finlande et Ukraine tout particulièrement) (**B**). La population nicheuse française, estimée à 20000 couples dans les années 2000, est principalement répartie à l'est du pays, dans le Massif central et les Pyrénées (**D**). Ailleurs, l'espèce est absente ou localisée, excepté dans quelques-uns de ses rares bastions telle la vallée de la Loire (Maine-et-Loire, Loire-Atlantique et Vendée) qui accueille 2700 à 5500 couples sur la période 2000-2006 (**D** ; **Noël, 2008**). En Bretagne, les derniers couples ont déserté leurs sites de nidification au début des années 2000 (monts d'Arrée, marais de Dol et de Gannedel) et l'espèce est considérée disparue d'Ille-et-Vilaine, donc de Bretagne administrative (**C**).

## Statut en Côtes-d'Armor

Même à l'époque où le Tarier des prés était trouvé nicheur localisé en Finistère, et bien que disposant de milieux aussi favorables (landes et prairies humides), aucun indice sérieux n'a laissé entrevoir une nidification historique de l'espèce en Côtes-d'Armor. Les quelques indices de nidification recueillis sont, en dehors de possibles confusions avec le Tarier pâtre, relatifs à des migrants.

Le Tarier des prés est de fait assez commun dans le département lors de ses déplacements printaniers et surtout automnaux (près de 84 % des données

recueillies). Hormis une donnée exceptionnellement précoce d'une femelle le 5 mars 1987 en baie de Saint-Brieuc, les premiers individus sont signalés au début du mois suivant et l'essentiel des oiseaux en transit printanier est relevé fin avril/début mai ; le dernier oiseau sur la période considérée est noté le 25 mai 1985 à Erquy. L'espèce est davantage présente à l'automne au cours de son passage qui débute en août et culmine les deux premières décades de septembre. C'est sur cette période que de rares concentrations sont relevées :

- 11 le 17 septembre 1989 au Meurtel (Langast)
- 12 le 17 septembre 1992 au Moulin Neuf (Plou-nérin)
- 11 le 17 septembre 1992 à l'Île-Grande (Pleumeur-Bodou)
- 12 le 3 septembre 1993 dans l'anse d'Yffiniac
- 11 le 4 septembre 2013 à l'aéroport de Saint-Brieuc (Trémuson).

La mention la plus tardive de ces mouvements post-nuptiaux date du 23 octobre 1999 au Palus (Plouguiel). Quatre données tardives voire hivernales (novembre, décembre et février) sont imputables à des erreurs d'identification. Les rares données en France à cette période concernent en effet le sud du pays et les observations réalisées à partir de la mi-novembre reposent peut-être en partie sur des confusions avec les femelles et immatures de Tarier pâtre (**D**).

Lors de son transit, le Tarier des prés est contacté sur une grande variété de milieux ouverts (landes, friches, dunes, bocages, aérodromes...), l'espèce se perchait en évidence sur les fourrés, arbustes, fils électriques et autres piquets de clôture. Le littoral concentre les données départementales du fait d'une plus grande pression d'observation mais probablement aussi en raison de mouvements migratoires spécifiques qui peuvent concentrer de manière temporaire des oiseaux sur la façade mari-

Auteur : Guillaume Laizet

Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances. Saint-Brieuc, 416 p.



# Tarier des prés

*Saxicola rubetra*



Groupe d'Etudes  
Ornithologiques  
des Côtes d'Armor

**G.E.O.C.A**

time et ses milieux de halte favorables.

## Tendances et perspectives

Le Tarier des prés présente, au cours du XX<sup>e</sup> s., une baisse de ses effectifs nicheurs dans plusieurs pays européens dont la France, où l'espèce est désormais classée comme *Vulnérable* sur la Liste Rouge des espèces menacées (**B**; **U**). Le programme STOC chiffre ce déclin à -59 % depuis 1989 et -40 % depuis 2001, laissant entrevoir une disparition à brève échéance des plaines françaises (**J**; **VN**). Les populations d'altitude sont aussi concernées par ce déclin depuis les années 1990 et, en France comme

ailleurs, le maintien de l'espèce semble soumis aux conditions d'hivernage et aux évolutions futures des activités agricoles (**C**; **D**; **Noël, 2008**). Dans ce contexte, les mentions de Tarier des prés en transit dans le département pourraient connaître une certaine baisse à l'avenir.

## Bibliographie

**Noël F. (2008)**. Le Tarier des prés. *In* Marchadour B. & Séchet E. (coord.). Avifaune prioritaire en Pays de la Loire. Coordination régionale LPO Pays de la Loire, Conseil Général des Pays de la Loire. p. 156-157.

Auteur : Guillaume Laizet

Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances. Saint-Brieuc, 416 p.

