

Tourterelle des bois

Streptopelia turtur



Groupe d'Etudes
Ornithologiques
des Côtes d'Armor

G.E.O.C.A

La Tourterelle des bois se reproduit en Afrique du Nord, en Europe (sauf Irlande, Ecosse et Scandinavie) et dans la partie ouest de l'Asie (**D**; **C**). En France, il s'agit d'une migratrice arrivant fin avril et d'une nicheuse commune avec 250 000 à 450 000 couples estimés dans les années 2000 et ne bénéficiant pas de statut de protection particulier (**D**). En Bretagne, l'espèce occupe l'ensemble du territoire continental et insulaire d'avril jusqu'à août/septembre, avec un domaine vital très vaste (jusqu'à 1 130 ha) en fonction des caractéristiques des habitats (**C**). La répartition de l'espèce ne semble pas avoir évolué depuis l'atlas 1970-1975 (**C**).


Statut en Côtes-d'Armor

La Tourterelle des bois se reproduit dans la quasi totalité des Côtes-d'Armor même si les indices certains sont difficiles à récolter, les chanteurs fournissant généralement les principaux indices de reproduction. Lors de l'enquête nicheur menée en 2012 dans le cadre de l'atlas Saint-Brieuc/Plérin, l'espèce se classe seulement 37^e en termes de fréquence et 38^e en termes d'abondance à Saint-Brieuc et, respectivement, 32^e et 37^e à Plérin. Ces répartitions et abondances traduisent sa faible

adaptabilité aux zones urbaines et agricoles intensives, l'espèce préférant les habitats diversifiés de bocages et de fourrés, notamment littoraux mais également les vallons boisés et les grandes friches comme la Grève des Courses (Langueux) (**P**). En moyenne, l'espèce arrive le 21 avril et est observée jusqu'au 18 septembre. L'individu le plus précocement observé l'a été le 24 février 2010 à Saint-Maurice (Morieux), le plus tardif le 24 octobre 1988 sur les bords de Rance.

La majorité des observations (63 %) concerne des individus isolés, 22 % concerne des pairs et seulement 15 % des groupes de 3 à 95 individus. C'est lors de la migration postnuptiale que de gros groupes peuvent être observés le long de la côte comme ce fut le cas le 26 août 1984 à Fréhel où 95 individus étaient posés sur un chaume de blé, mais également à l'intérieur des terres où un regroupement de 50 individus a été observé le 28 août 1996 à l'étang de Bosméléac (Le Bodéo). Lors du suivi de la migration des passereaux à la Cotentin (Planguenoual), l'espèce n'est pas observée. Seul 1 individu a été noté en 2012 (**T**). Il en va de même aux falaises de Carolles (Normandie) où seuls 6 individus ont été notés en 2012 et 2 en 2013.

Tourterelle des bois Nidification (2004-2012)



Auteur : Sandy Garandeau

Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances. Saint-Brieuc, 416 p.

Tourterelle des bois

Streptopelia turtur



Groupe d'Etudes
Ornithologiques
des Côtes d'Armor

G.E.O.C.A

Tendances et perspectives

La population européenne de Tourterelle des bois est en baisse significative depuis plusieurs décennies (-66 % entre 1980 et 2006) et cette tendance se retrouve plus récemment en France avec une baisse de 10 % du nombre de mâles chanteurs dénombrés au printemps en 10 ans (**J**; **C**). En Bretagne et en Côtes-d'Armor ce déclin ne semble pas s'être encore manifesté. Les causes sont multiples, l'espèce ayant subi de fortes pertes lors de sa migration dues au braconnage à la fin des années 1990, durant l'hiver à cause de l'intensification de la production céréalière en Afrique (où ont en outre lieu des prélèvements significatifs) et lors de sa nidification à cause de la dégradation de ses habitats (haies) qu'ils convient donc de maintenir. Un plan de gestion de l'espèce a été mis en place au niveau de l'Union Européenne afin de maintenir ses habitats et d'améliorer les connaissances (**C**).



Auteur : Sandy Garandeau
Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances. Saint-Brieuc, 416 p.

