

Bernache du Canada

Branta canadensis



Groupe d'Etudes
Ornithologiques
des Côtes d'Armor

G.E.O.C.A

Les espèces allochtones correspondent d'une part aux espèces présentes dans la nature en raison de lâchers intentionnels (notamment les espèces « gibier » à but cynégétique tels le Faisan de Colchide et la Perdrix rouge), d'autre part aux échappées de captivité (majorité des espèces « d'ornements », possédées à titre privé ou provenant de zoos ou parcs). A noter que quelques espèces n'ont pas été listées ici, faute de détails sur les observations (Flamant sp., Canard mandarin, Colin de Californie, Perruche callopsitte).

Statut en Côtes-d'Armor

La Bernache du Canada, originaire d'Amérique du nord, a été introduite dans la plupart des pays du nord-ouest de l'Europe (**D**). En Côtes-d'Armor l'espèce est mentionnée pour la première fois en 1991 (1 individu à Pleudihen-sur-Rance du 1er au 12 décembre) puis régulièrement contactée depuis, essentiellement sur la côte à l'exception de 3 étangs intérieurs : Beffou (Plougras), Moulin Neuf (Plounérin) et les Salles (Perret). Si 80 % des données concernent des individus isolés, jusqu'à 7 oiseaux groupés ont été observés les 20 mars 1994 (estuaire du Jaudy) et 25 mars 2007 (Trémuson). Une mention de reproduction retient l'attention : 7 oeufs non éclos à Brélidy le 8 août 2014.



Auteur : Sandy Garandeau et Guillaume Laizet
Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances. Saint-Brieuc, 416 p.