

Tadorne casarca

Tadorna ferruginea



Groupe d'Etudes
Ornithologiques
des Côtes d'Armor

G.E.O.C.A

Les espèces allochtones correspondent d'une part aux espèces présentes dans la nature en raison de lâchers intentionnels (notamment les espèces « gibier » à but cynégétique tels le Faisan de Colchide et la Perdrix rouge), d'autre part aux échappées de captivité (majorité des espèces « d'ornements », possédées à titre privé ou provenant de zoos ou parcs). A noter que quelques espèces n'ont pas été listées ici, faute de détails sur les observations (Flamant sp., Canard mandarin, Colin de Californie, Perruche callopsitte).

Statut en Côtes-d'Armor

Le Tadorne casarca est une espèce monotypique nichant en Afrique du nord, plus ponctuellement de la Grèce à l'Asie centrale et plus à l'est encore **(D)**. La première mention départementale concerne 1 ind. présent du 21 novembre au 2 décembre 1978

dans l'anse d'Yffiniac. Par la suite 1 à 8 oiseaux sont relevés à Beauport (Paimpol) en 1999 et 2001, Taden en 2003, La Roche-Derrien en 2004 et en baie de Saint-Brieuc en 2001 et 2011. Mais les trois quarts des données concernent des oiseaux présents entre 2003 et 2011 en baie de Lannion, dont une reproduction en 2006 sur l'étang du Vorlenn (Trédrez-Locquémeau) où des altercations violentes prennent place avec le Tadorne de Belon **(Perlberg, 2010)**.

Bibliographie

Perlberg D. (2010). Note. Agressivité du Tadorne casarca *Tadorna ferruginea* à l'égard du Tadorne de Belon *Tadorna tadorna*. *Le Fou*, 80 : 15-17.

Auteur : Sandy Garandeau et Guillaume Laizet

Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances. Saint-Brieuc, 416 p.

