

Dendrocygne fauve

Dendrocygna bicolor



Groupe d'Etudes
Ornithologiques
des Côtes d'Armor

G.E.O.C.A

Les espèces allochtones correspondent d'une part aux espèces présentes dans la nature en raison de lâchers intentionnels (notamment les espèces « gibier » à but cynégétique tels le Faisan de Colchide et la Perdrix rouge), d'autre part aux échappées de captivité (majorité des espèces « d'ornements », possédées à titre privé ou provenant de zoos ou parcs). A noter que quelques espèces n'ont pas été listées ici, faute de détails sur les observations (Flamant sp., Canard mandarin, Colin de Californie, Perruche callopsitte).

Statut en Côtes-d'Armor

Le Dendrocygne fauve est présent sur le continent américain, en Afrique tropicale ainsi qu'en région indienne et birmane. En France, où l'on connaît 3 cas de reproduction certaine entre 1999 et 2007, l'espèce fait l'objet d'observations régulières (**Dubois, 2012**). Trois données d'oiseaux isolés ont été recueillies dans les Côtes d'Armor : le 30 septembre 1990 à l'étang de Châtelaudren, le 22 février 1998 sur le Trieux à Pont Ezer (Guingamp) et le 29 août 2002 à Bourrienne (Langueux).

Bibliographie

Dubois P.-J. (2012). Les oiseaux allochtones en France en 2011 : 2ème enquête. *Ornithos* n°96 19-4, Juillet-Août 2012.

Auteur : Sandy Garandeau et Guillaume Laizet
Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances. Saint-Brieuc, 416 p.

