

Erismature rousse

Oxyura jamaicensis



Groupe d'Etudes
Ornithologiques
des Côtes d'Armor

G.E.O.C.A

Les espèces allochtones correspondent d'une part aux espèces présentes dans la nature en raison de lâchers intentionnels (notamment les espèces « gibier » à but cynégétique tels le Faisan de Colchide et la Perdrix rouge), d'autre part aux échappées de captivité (majorité des espèces « d'ornements », possédées à titre privé ou provenant de zoos ou parcs). A noter que quelques espèces n'ont pas été listées ici, faute de détails sur les observations (Flamant sp., Canard mandarin, Colin de Californie, Perruche callopsitte).

Statut en Côtes-d'Armor

L'Erismature rousse est originaire d'Amérique du Nord. Suite à son introduction en France, l'espèce y est implantée (41 couples reproducteurs et 220 hivernants en 2011, surtout au Lac de Grand Lieu, Loire- Atlantique) et une éradication est en cours

(Dubois, 2012). En Côtes-d'Armor les observations s'inscrivent entre le 27 septembre et le 30 mars des années 1985 à 2005. Elles concernent essentiellement l'est du département (estuaire de la Rance entre Saint-Jacut-de-la-Mer et Taden, 12 données) et la baie de Saint-Brieuc (5 données). Une seule observation est intérieure (étang de Pellinec à Canihuel) et une seule mention concerne plus d'1 ind. (2 femelles sur la Rance en 2001).

Bibliographie

Dubois P.-J. (2012). Les oiseaux allochtones en France en 2011 : 2ème enquête. *Ornithos* n°96 19-4, Juillet-Août 2012.

Auteur : Sandy Garandeau et Guillaume Laizet

Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances. Saint-Brieuc, 416 p.

