

# Ibis sacré

*Threskiornis aethiopicus*



Groupe d'Etudes  
Ornithologiques  
des Côtes d'Armor

**G.E.O.C.A**

Les espèces allochtones correspondent d'une part aux espèces présentes dans la nature en raison de lâchers intentionnels (notamment les espèces « gibier » à but cynégétique tels le Faisan de Colchide et la Perdrix rouge), d'autre part aux échappées de captivité (majorité des espèces « d'ornements », possédées à titre privé ou provenant de zoos ou parcs). A noter que quelques espèces n'ont pas été listées ici, faute de détails sur les observations (Flamant sp., Canard mandarin, Colin de Californie, Perruche callopsitte).

## Statut en Côtes-d'Armor

L'ibis sacré est originaire d'Afrique subtropicale **(D)**. Les premières reproductions hexagonales ont été notées en 1993 au lac de Grand-Lieu (Loire-Atlantique) et en 1994 dans le golfe du Morbihan **(C)**. Les tirs décidés pour limiter son extension semblent réduire la population française (1 700 ind. en 2006,

670 en 2010) **(Dubois, 2012)**. En Côtes-d'Armor, l'espèce a été observée à toute période de l'année entre 1991 et 2009 sans fournir d'indice de nidification mais 2 ind. sont notés dans la colonie d'Aigrette garzette de l'île Saint-Riom (Ploubazlanec) le 18 juillet 2007. L'essentiel des données concerne des individus isolés (85%), uniquement sur des zones de vasières littorales. Quelques stationnements ont pris place, notamment de début octobre à fin novembre 2009 sur l'estuaire du Jaudy et du 27 juin au 12 septembre 2005 à Bon abri (Hillion).

## Bibliographie

**Dubois P.-J. (2012)**. Les oiseaux allochtones en France en 2011 : 2ème enquête. *Ornithos* n°96 19-4, Juillet-Août 2012.

Auteur : Sandy Garandeau et Guillaume Laizet

Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances. Saint-Brieuc, 416 p.

