

Faisan de Colchide

Phasianus colchicus



Groupe d'Etudes
Ornithologiques
des Côtes d'Armor

G.E.O.C.A

Les espèces allochtones correspondent d'une part aux espèces présentes dans la nature en raison de lâchers intentionnels (notamment les espèces « gibier » à but cynégétique tels le Faisan de Colchide et la Perdrix rouge), d'autre part aux échappées de captivité (majorité des espèces « d'ornements », possédées à titre privé ou provenant de zoos ou parcs). A noter que quelques espèces n'ont pas été listées ici, faute de détails sur les observations (Flamant sp., Canard mandarin, Colin de Californie, Perruche callopsitte).

Statut en Côtes-d'Armor

Le Faisan de Colchide est une espèce polytypique introduite en Europe (D). Les tendances sont difficiles à établir car il ne fait pas l'objet de renseignements systématiques par les observateurs. L'espèce aurait néanmoins du mal à se maintenir sans les lâchers à but cynégétique même si des reproductions certaines (nids avec oeufs et familles) parsèment le fichier départemental depuis 1985 (sept cas sur la période 2004-2012). L'espèce est ainsi bien répandue toute l'année sur le département et les contacts sonores fréquents, surtout au printemps (la moitié des données concernent les mois de mars, avril et mai).



Auteur : Sandy Garandeau et Guillaume Laizet
Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances. Saint-Brieuc, 416 p.

