

# Perdrix rouge

*Alectoris rufa*



Groupe d'Etudes  
Ornithologiques  
des Côtes d'Armor

**G.E.O.C.A**

Les espèces allochtones correspondent d'une part aux espèces présentes dans la nature en raison de lâchers intentionnels (notamment les espèces « gibier » à but cynégétique tels le Faisan de Colchide et la Perdrix rouge), d'autre part aux échappées de captivité (majorité des espèces « d'ornements », possédées à titre privé ou provenant de zoos ou parcs). A noter que quelques espèces n'ont pas été listées ici, faute de détails sur les observations (Flamant sp., Canard mandarin, Colin de Californie, Perruche callopsitte).

## Statut en Côtes-d'Armor

La Perdrix rouge, sédentaire, niche en France méridionale (Corse comprise), en Italie et sur l'île d'Elbe (**D**). L'espèce était autrefois bien relevée à l'est du département, apportant même par trois fois des indices de reproduction certaine (présence de jeunes) : Fréhel en 1989, Evran en 1997 et Morieux en 2003. Depuis cette dernière date, les mentions (sans indice certain de reproduction) ne concernent plus que l'ouest du département, probablement en raison de lâchers à but cynégétique qui y maintiennent l'espèce mais rendent toute analyse délicate (**C**).



Auteur : Sandy Garandeau et Guillaume Laizet  
Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances. Saint-Brieuc, 416 p.

