

Pigeon biset (féral)

Columbia livia



Groupe d'Etudes
Ornithologiques
des Côtes d'Armor

G.E.O.C.A

Les espèces allochtones correspondent d'une part aux espèces présentes dans la nature en raison de lâchers intentionnels (notamment les espèces « gibier » à but cynégétique tels le Faisan de Colchide et la Perdrix rouge), d'autre part aux échappées de captivité (majorité des espèces « d'ornements », possédées à titre privé ou provenant de zoos ou parcs). A noter que quelques espèces n'ont pas été listées ici, faute de détails sur les observations (Flamant sp., Canard mandarin, Colin de Californie, Perruche callopsitte).

Statut en Côtes-d'Armor

Le Pigeon biset est une espèce polytypique nichant des îles Britanniques et du sud de l'Europe jusqu'au sud de l'Oural ainsi qu'en Afrique du nord (**D**). En Bretagne, la forme urbica correspond au Pigeon des villes, présent partout tandis que la sous-espèce livia, souche sauvage, n'est réellement établie de manière continue qu'à Belle-Ile dans le Morbihan (**C**). Dans les Côtes-d'Armor, la forme des villes est tout aussi bien présente tandis que la souche sauvage occuperait encore, selon certains auteurs, les falaises de Plouha et de Fréhel (**C**). Nous considérons pour notre part cette souche éteinte, ou du moins indissociable d'hybrides impliquant sa forme urbaine.



Auteur : Sandy Garandeau et Guillaume Laizet
Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances. Saint-Brieuc, 416 p.