

Perruche à collier

Psittacula krameri



Groupe d'Etudes
Ornithologiques
des Côtes d'Armor

G.E.O.C.A

Les espèces allochtones correspondent d'une part aux espèces présentes dans la nature en raison de lâchers intentionnels (notamment les espèces « gibier » à but cynégétique tels le Faisan de Colchide et la Perdrix rouge), d'autre part aux échappées de captivité (majorité des espèces « d'ornements », possédées à titre privé ou provenant de zoos ou parcs). A noter que quelques espèces n'ont pas été listées ici, faute de détails sur les observations (Flamant sp., Canard mandarin, Colin de Californie, Perruche callopsitte).

Statut en Côtes-d'Armor

La Perruche à collier niche dans une partie de l'Afrique, de l'Inde et jusque l'Asie du Sud-Est (**D**). La première donnée départementale concerne Bréhat en novembre 1986. Les mentions suivantes se rattachent essentiellement à des individus isolés sur le littoral, exceptions faites de 2 oiseaux le 12 février 1995 en forêt de Lorge et d'1 couple avec 4 immatures le 13 juin 2002 à Pédernec.

Auteur : Sandy Garandeau et Guillaume Laizet
Extrait de GEOCA (2014). Oiseaux des Côtes-d'Armor. Statut, distribution, tendances. Saint-Brieuc, 416 p.

